NR. 2482 /16.03.2023

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471
Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: ofiasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 3 din 14.03.2023

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:

Ceutorhynchus napi - Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

Insecta iernează ca adult în stratul superficial al solului de la baza plantelor. Adulții își fac apariția când temperaturile trec de 9 -10°C, zborul intens având loc când temperatura aerului depășește 12°C.Femelele depun ouăle în tulpinile tinere, preferând vârfurile lăstarilor.

*Larvele de **Ceutorhynchus napi** pot produce pagube de 30-40% din recoltă, deoarece sapă galerii în tulpinile de rapiță, plantele atacate ramifică bogat, stagnează în creștere și nu formează silicve sau acestea sunt seci și cu semințe de slabă calitate. Deoarece este distrusă măduva tulpinilor, plantele se pot frânge în urma vijeliilor.*

Prevenirea atacului se realizează prin combaterea adulților cât mai timpuriu, la apariția în masă a acestora, până la depunerea pontei.




Brevicoryne brassicae - Păduchele cenușiu al verzei

Dăunător cu mari posibilități de reproducere, prezintă în câmp 16-20 generații de adulți. Primele colonii apar primăvara, în cursul lunii aprilie. Formează colonii aglomerate pe meristeme, frunze, tulpini, inflorescențe, flori și silicve din care extrag seva. Ca efect, frunzele se gofrează și plantele se opresc din creștere.



Phyllotreta spp. - **Puricii cruciferelor**

Dăunătorii iernează ca adulți sub resturi vegetale sau în stratul superficial al solului. Adulții hibernanți îți fac apariția primavara devreme și sunt activi în zilele însorite și călduroase. Puricii rod epiderma superioară sub formă de mici orificii circulare care duc la ciuruirea frunzelor. Frunzele puternic atacate se usucă. Atacul este periculos în primaverile secetoase.



Erysiphe communis - **Făinarea rapiței**

Boala se poate manifesta încă din toamnă, în condiții de temperaturi ridicate și umiditate atmosferică mare. Pe ambele fețe ale frunzei se formează o pâslă albicioasă care apoi devine pulverulentă, datorită apariției fructificațiilor. În condiții favorabile, petele pot crește, se unesc și acoperă în întregime organele atacate: frunze, tulpini și silicve. Când atacul este foarte puternic plantele pierd frunzele afectate. Pentru prevenirea apariției bolii se recomandă evitarea cultivării rapței pe terenuri joase și umede, respectarea rotației culturilor, arături la adâncime optimă, alegerea de hibrizi puțin vulnerabili, densitate optimă, fertilizare optimă, combaterea buruienilor.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile de rapită de toamnă, la depistarea dăunătorilor, cu unul din produsele:

1. ***DECIS EXPERT 100 EC - 75 ml/ha;***
2. ***INAZUMA - 0,15-0,2 kg/ha***

sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Combaterea făinarii se face prin tratarea plantelor imediat după apariția pâslei caracteristice acestei boli sau preventiv dacă există riscul apariției bolii, cu unul din produsele:

1. ***TILMOR 240 EC (CORINTH 240 EC - a doua denumire comerciala) - 1,0 l/ha;***
2. ***PICTOR (FILAN SC - a doua denumire comerciala) - 0,5 L/ha***

sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Se vor controla permanent culturile de rapiță și se va interveni cu tratament pentru limitarea atacului.

Alte recomandări:

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena Ulea

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA - Oficiul Fitosanitar Iași