NR. 6740 /11.07.2024

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: ofiasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.33 din 09.07.2024

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Laspeyresia funebrana - Viermele prunelor

Viermele prunelor este unul dintre cei mai păgubitori dăunători ai livezilor de pruni. Insecta are 2-3 generații pe an și iernează ca larvă învelită într-un cocon mătăsos impregnat cu ceară care-i dă impermeabilitate și o apără de intemperii. Adulții primei generații apar în decursul lunii mai, iar apariția lor este eșalonată, fiind influențată de condițiile climatice. Larvele rod galerii în pulpa fructelor tinere care dau aspect de caverne. Când atacul se produce la suprafața pulpei au loc secreții de clei. Hrana larvelor o constituie mezocarpul fructelor și foarte rar sâmburii cruzi.Tratamentele de combatere a viermelui prunelor se fac preventiv, înainte de apariția larvelor.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în livezile de prun pe rod, pentru generația III, în perioada 11 - 13.07, cu produsul:

1. Laser 240 SC (Nexsuba - a doua denumire comercială) = 0,6 L/ha

sau alte produse pentru protecția plantelor, omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nu se vor trata soiurile cu coacere timpurie.

Tratamentul se va repeta la 6-8 zile.

Pentru stabilirea exactă a momentului de apariție a fluturilor și supravegherea evoluției dăunătorului, în vederea aplicării tratamentelor de combatere dar și pentru reducerea rezervei biologice prin captarea masculilor, se pot utiliza capcanele cu feromoni de tip atraFUN.

Alte recomandări:

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

În zilele caniculare aplicați tratamentele fitosanitare seara sau dimineața devreme.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena ULEA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA - Oficiul Fitosanitar Iași

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: ofiasi@anfof.ro

NR. 6776 / 12.07.2024


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 34 din 11.07.2024

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Carpocapsa(Cydia)pomonella - Viermele merelor

Este unul dintre cei mai periculoși dăunători ai mărului. Pe lângă măr, pagube mai mari poate produce la păr, gutui și nuc . Dăunătorul poate avea două și uneori trei generații pe an, în funcție de suma temperaturilor efective. Această insectă iernează ca larvă matură, învelită într-un cocon mătăsos impermeabil, sub crăpăturile scoarței pomilor, sub frunzișul de sub pomi. Primavara, când sunt temperaturi peste 9°C, larvele se tansformă în crisalide și după o perioadă apar adulții, fluturașii primei generații. Ponta este depusă pe fructe și frunze. Larvele pătrund în pulpa fructului și sapă galerii către zona casei seminale, unde distrug semințele, din care cauză fructele nu mai cresc. Larvele din prima generație cauzează pierderi totale la fructele atacate, deoarece acestea fiind mici cad și nu se pot valorifica.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în livezile de semințoase pe rod, pentru generația III, în perioada 13 - 15.07, cu unul din produsele:

1. ***Laser 240 SC (Nexsuba - a doua denumire comercială) = 0,9 L/ha***
2. ***Decis 25 WG = 0,003% (0,045 Kg/ha)***

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nu se vor trata soiurile cu coacere timpurie.

Tratamentul se va repeta la 6 - 8 zile .

Pentru stabilirea exactă a momentului de apariție a fluturilor și supravegherea evoluției dăunătorului, în vederea aplicării tratamentelor de combatere dar și pentru reducerea rezervei biologice prin captarea masculilor, se pot utiliza capcanele cu feromoni de tip atraPOM.

Alte recomandări:

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

În zilele caniculare aplicați tratamentele fitosanitare seara sau dimineața devreme.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena ULEA

NR. 6777 /12.07.2024

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: ofiasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 35 din 11.07.2024

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Quadraspidiotus perniciosus - Păduchele din San José

Păduchele din San José este o specie polifagă, atacă diferite specii de pomi fructiferi, arbori și arbuști. Speciile pomicole preferate sunt semințoasele, urmate de sâmburoase. În condițiile țării noastre prezintă 1- 3 generații pe an, cel mai frecvent 2 generații. Iernează în stadiul de larvă de varsta I-a sub scut, pe scoarța pomilor. Insecta colonizează părțile lemnoase (tulpini și ramuri), precum și funzele și fructele pomilor.

Preferă mai ales părțile lemnoase ale pomilor, în special scoarța lăstarilor pe care o înțeapă, sugând conținutul celular al țesuturilor. În zonele atacate, sub scoarță, lemnul se înroșește, iar pe frunze și fructe se formează pete roșii în jurul locului de fixare. În condiții de atac puternic pomii se usucă în câțiva ani. Pomii maturi rezistă mai bine atacului față de cei tineri din pepiniere sau plantații noi.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în livezile de pomi fructiferi cu rezervă biologică a dăunătorului, la apariția larvelor mobile din generația II, în perioada 13 - 15 .07, cu produsul :

1. Decis 25 WG = 0,003% (0,045 Kg/ha la măr și 0,030 Kg/ha la prun)
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Acordați atenție deosebită pepinierelor.

Alte recomandări:

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

În zilele caniculare aplicați tratamentele fitosanitare seara sau dimineața devreme.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena ULEA