NR. 5213/30.05.2025

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR IASI Str.Dumbrava Roșie nr. 3, Iasi, jud. Iași
tel: 0232272390/0787603965 Email:ofiasi@anfof.ro


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.23 din 29.05. 2025

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Plasmopara viticola - mana viței de vie

Mana afectează toate organele verzi ale viței de vie: frunze, lăstari,ciorchini și cârcei, inflorescențe, boabe. Frunzele pot fi atacate după ce ating o suprafață de 10-25 cm² și până ce îmbătrânesc, când manifestă rezistență sporită la mană. Pe frunze apar pete untdelemnii, circulare sau neregulate. În perioadele umede, pe partea inferioară a frunzelor, în zona petelor, apare un puf albicios, format din fructificațiile ciupercii. În timp petele se brunifică și se usucă. Spre toamnă, pe frunze pot să apară pete de 1-2 mm diametru, colțuroase, dând frunzelor aspect mozaicat. Pe timp umed, ciorchinii, inflorescențele și boabele mici atacate se acoperă cu puf albicios, apoi se necrozează și se usucă. Boabele mai dezvoltate, după atac, capătă o culoare vineție-murdară, se zbârcesc și se desprind mai ușor de pe pedicele. Transmiterea bolii peste iarnă se face prin frunzele mozaicate, căzute pe sol. Apariția bolii este favorizată de precipitații abundente, umiditate ridicată a aerului, temperaturi moderate, lipsa unei bune aerisiri cauzată de îmburuienare și neefectuarea la timp a lucrărilor de dirijat, copilit, cârnit.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în plantațiile viticole, prefloral, cu unul din produsele:

1. Profiler 71,1 WG = 2,25 - 2,5 kg/ha

Profiler 71,1 WG nu este compatibil cu produse ce conțin cupru sau dicofol și cu îngrășăminte foliare care au în compoziție azot.Verificați cu atenție compatibilitatea și cu alte produse pentru protecția plantelor, după caz.

2.Zorvec Zelavin (ORONDIS - a doua denumire comercială) = 0,2 - 0,6 L/ha

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Uncinula necator - făinarea viței de vie

Făinarea atacă toate părțile verzi ale plantei, frunzele, inflorescențele, lăstarii, ciorchinii, boabele, cârceii. Pe organele atacate apare o pâslă alb - gri, pe care, cu timpul, se formează o pulbere de aceeași culoare. Pâsla poate aparea sub formă de pete sau poate acoperi întregul organ atacat, în funcție de condițiile climatice din perioada respectivă. În dreptul atacului țesutul se decolorează. Boabele atacate în perioada de formare, imediat după înflorit, se usucă, cele atacate

mai târziu, în perioada de creștere intensă, crapă. Tratamentele înainte și după înflorit sunt considerate de siguranță, în mod deosebit cel după înflorit, care este obligatoriu. Cum aceste tratamente sunt de siguranță și împotiva manei se vor prefera produsele compatibile pentru tratamente mixte.

Lobesia(Polychrosis) botrana- Molia verde a strugurilor(eudemisul)

Dăunătorul are trei generații pe an. Larvele ultimei generații iernează în stadiul de coconi în crăpăturile scoarței sau în sol, unde se transformă în crisalide. Din ouăle depuse de fluturii care apar primăvara, spre sfârșitul lunii mai, eclozează larvele. O larvă poate consuma 60 - 80 boboci florali în timpul evoluției sale. În caz de invazie larvele se instalează pe lăstarii sau frunzele tinere.

Pragul biologic al dăunătorului este de 12°C. Momentul optim de combatere, din punct de vedere fenologic, corespunde cu înflorirea portaltoiului Riparia rupestris. Acesta înflorește cu aproximativ o săptămână înaintea celorlalte soiuri.

Pentru monitorizarea rezervei biologice a dăunătorului în plantație și stabilirea exactă a momentului de apariție a fluturilor și supravegherea evoluției dăunătorului, în vederea aplicării tratamentelor de combatere, dar și pentru reducerea rezervei biologice prin captarea masculilor, se pot utiliza capcanele cu feromoni de tip atraBOT.

Eupoecilia ambiguela - molia brună a strugurilor(cochilisul)

Larvele generației I atacă inflorescențele pe care le înfășoară cu fire de mătase de culoare albicioasă, iar larvele generației a II a atacă boabele verzi sau în pârgă.

Pentru monitorizare se folosesc capcanele cu feromoni atraAMBIG.

De obicei, tratamentele pentru combaterea moliilor strugurilor se execută în același timp cu cele pentru mană și făinare, după caz, folosindu-se produse compatibile.

Alte recomandări:

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena ULEA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA - Oficiul Fitosanitar Iași