AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR IASI Str.Dumbrava Roșie nr. 3, Iasi, jud. Iași
tel: 0232272390/0787603965 Email:ofiasi@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 25 din 05.06.2025 NR. 5431 /06.06.2025

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Quadraspidiotus perniciosus - Păduchele din San José

Păduchele din San José este o specie polifagă, atacă diferite specii de pomi fructiferi, arbori și arbuști. Speciile pomicole preferate sunt semințoasele, urmate de sâmburoase. În condițiile țării noastre prezintă 1- 3 generații pe an, cel mai frecvent 2 generații. Păduchele din San Jose se înmulțește vivipar.Iernează în stadiul de larvă de vârsta I-a sub scut, pe scoarța pomilor. Insecta colonizează părțile lemnoase (tulpini și ramuri), precum și funzele și fructele pomilor. Preferă mai ales părțile lemnoase ale pomilor, în special scoarța lăstarilor pe care o înțeapă, sugând conținutul celular al țesuturilor. În zonele atacate, sub scoarță, lemnul se înroșește, iar pe frunze și fructe se formează pete roșii în jurul locului de fixare. În condiții de atac puternic pomii se usucă în câțiva ani. Pomii maturi rezistă mai bine atacului față de cei tineri din pepiniere sau plantații noi.Larvele generației I apar sub carapacea femelelor la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, în funcție de evoluția temperaturilor. Larvele fiecărei generații au culoarea portocalie și se răspândesc pe ramuri, tulpini, pe frunze și fructe, fiind mobile 24 de ore. În acest timp larvele pot fi transportate pe picioarele și penele păsărilor, pe hainele pomicultorilor, pot fi duse de curenții de aer, infestând astfel pomii sănătoși. În timp ce se hrănesc, larvele secretă fibre de mătase și o ceară specială din care-și formează scutul protector. La începutul formării scutului ceara fiind mai puțin densă este ușor străbătută de insecticide. În livezile infestate cu San José viespea parazită Prospaltella perniciosi este întâlnită adeseori. Dezvoltarea viespiei este afectată de tratamentele cu insecticide. În plantațiile ecologice infestate, combaterea biologică se poate realiza prin lansări de Prospaltella perniciosi începând cu sfârșitul primăverii până în toamnă. Eficiența utilizării entomofaunei în combaterea păduchelui de San José este bună atunci când populațiile dăunătorului nu sunt mari.







Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la pomii fructiferi, în livezile cu rezervă biologică a dăunătorului, la apariția larvelor mobile din generația I, în perioada 07 - 10.06, cu unul din produsele:

1. *Mospilan 20 SG (Krima 20 SG -a doua denumire comercială)= 0,025 - 0,03% (0,375 - 0,450 kg/ha la măr și 0,250 -0,300 kg/ha la prun)*
2. *Decis 25 WG = 0,003% (0,045 kg/ha la măr și 0,030 Kg/ha la prun)*

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va repeta la 7-12 zile. Tratamentul se poate complexa cu fungicide omologate și compatibile pentru combaterea bolilor(rapăn, făinare, etc), după caz.

<u>Alte recomandări:</u>

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare
Sonia Elena ULE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA - Oficiul Fitosanitar Iași